

Режим терапии

дерматологической токсичности
1 степени на время приема
противоопухолевого препарата
ингибитора EGFR

Пациент

Возраст

Дата

Отметка врача о назначении	Категория средств/препарат	Способ применения
Выбор одного препарата	Доксициклин капсулы 100 мг	Принимать 2 раза в сутки внутрь длительно
	Миноциклин капсулы 50 мг	Принимать 2 раз в сутки внутрь длительно
	Бережное очищение кожи	Не использовать мыло на зону высыпаний. Желательно использовать для очищения кожи молочко и затем тоник утром и вечером
	Увлажняющий крем	Наносить на лицо, руки, ноги, шею, спину и грудь утром ежедневно (после очищения кожи)
	<ul style="list-style-type: none">• Солнцезащитный крем• Средства с солнцезащитным фильтром SPF > 30, PPD > 1/3 SPF	Наносить перед выходом на улицу на откры- тые участки тела в период весна-осень
Выбор одного препарата	Гидрокортизоновая мазь 1%	Наносить очень тонким слоем 2 раза в день на зоны высыпания
	Алклометазона дипропионат 0,05% крем, мазь	Наносить очень тонким слоем 2 раза в день на зоны высыпания
	Метилпреднизолона ацепонат 0,1% эмульсия, крем, мазь	Наносить очень тонким слоем до 2 раз в день на зоны высыпания, при уменьшении высыпаний — 1 раз в день.
	Контрольный осмотр через 2 недели	
	Контрольный осмотр через 4–6 недель	

Врач