

# Режим терапии

## дерматологической токсичности 2 степени на время приема противоопухолевого препарата ингибитора EGFR

Пациент .....

Возраст .....

Дата .....

Отметка врача о назначении	Категория средств/препарат	Способ применения
Выбор одного препарата	Доксициклин капсулы 100 мг	Принимать 2 раза в сутки внутрь длительно
	Миноциклин капсулы 50 мг	Принимать 2 раз в сутки внутрь длительно
	Бережное очищение кожи	Не использовать мыло на зону высыпаний. Желательно использовать для очищения кожи молочко и затем тоник утром и вечером
	Увлажняющий крем	Наносить на лицо, руки, ноги, шею, спину и грудь утром ежедневно (после очищения кожи)
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Солнцезащитный крем</li><li>• Средства с солнцезащитным фильтром SPF &gt; 30, PPD &gt; 1/3 SPF</li></ul>	Наносить перед выходом на улицу на откры- тые участки тела в период весна-осень
Выбор одного препарата	Бетаметазон + фузидовая кислота, крем	Наносить очень тонким слоем 2 раза в день на зоны высыпания
	Бетаметазона дипропионат 0,05%, 0,1%, крем	Наносить очень тонким слоем 2 раза в день на зоны высыпания
Выбор одного препарата (если не назначена фузидовая кислота)	Метронидазол крем 1%	Наносится на кожу тонким слоем и слегка втирается 1–2 раза в день.
	Клиндамицин гель для наружного применения (в 1 г геля — 10 мг клиндамицина)	Наносится на кожу тонким слоем и слегка втирается 1–2 раза в день.
	Бензоила пероксид 2,5%/5%, гель	Наносится на кожу тонким слоем 1 раз в день.
Выбор одного препарата	Пимекролимус крем 1%	При выраженном отеке и зуде кожи лица наносить на кожу лица 2 раза в день
	Такролимус мазь 0,03%	При выраженном отеке и зуде кожи лица наносить на кожу лица 2 раза в день
	Контрольный осмотр через 2 недели	
	Контрольный осмотр через 4–6 недель	

Врач .....