

Режим терапии

Пациент

Возраст

Дата

**дерматологической токсичности
3 степени на время приема
противоопухолевого препарата
ингибитора EGFR**



- Временно ПРЕКРАТИТЬ прием противоопухолевого препарата ингибитора EGFR
- КОНСУЛЬТАЦИЯ дерматолога в течение 1 недели (на консультацию взять данный лист с собой)

Отметка врача о назначении	Категория средств/препарат	Способ применения
Выбор одного препарата	Доксциклин капсулы 100 мг	Принимать 2 раза в сутки внутрь длительно
	Миноциклин капсулы 50 мг	Принимать 2 раз в сутки внутрь длительно
Выбор одного препарата	Дексаметазон 0,5 мг таблетки 0,08 мг/кг × кг (вес пациента) = мг = таблеток в день	Принимать внутрь 7 дней после еды, за 2 приема: • утро таблеток • день таблеток
	Преднизолон 5 мг таблетки 0,5 мг/кг × кг (вес пациента) = мг = таблеток в день	Принимать внутрь 7 дней после еды, за 2 приема: • утро таблеток • день таблеток
	Бережное очищение кожи	Не использовать мыло на зону высыпаний. Желательно использовать для очищения кожи молочко и затем тоник утром и вечером
	Увлажняющий крем	Наносить на лицо, руки, ноги, шею, спину и грудь утром ежедневно (после очищения кожи)
	<ul style="list-style-type: none">• Солнцезащитный крем• Средства с солнцезащитным фильтром SPF > 30, PPD > 1/3 SPF	Наносить перед выходом на улицу на открытые участки тела в период весна–осень
Выбор одного препарата	Бетаметазон + фузидовая кислота, крем	Наносить очень тонким слоем 2 раза в день на зоны высыпания
	Бетаметазона дипропионат 0,05%, 0,1%, крем	Наносить очень тонким слоем 2 раза в день на зоны высыпания

Отметка врача о назначении	Категория средств/препарат	Способ применения
Выбор одного препарата (если не назначена фузидовая кислота)	Эритромициновая мазь 10000 ЕД в 1 г	Наносить тонким слоем 2 раза в день на зоны высыпания
	Бацитрацин и неомицин мазь 250 ME + 5000 ME/1 г.	Наносить тонким слоем 2 раза в день на зоны высыпания до 10 дней
	Мупируцин мазь 2%	Наносить тонким слоем 2 раза в день на зоны высыпания до 10 дней
Выбор одного препарата	Пимекролимус крем 1%	При выраженном отеке и зуде кожи лица наносить на кожу лица 2 раза в день
	Такролимус мазь 0,03%	При выраженном отеке и зуде кожи лица наносить на кожу лица 2 раза в день
Контрольный осмотр через 1 неделю		
Контрольный осмотр через 2 недели		
Контрольный осмотр через 4–6 недель		

Врач.....