


Далее приводятся алгоритмы диагностики и лечения трофобластической болезни и план первичного обследования (Л.А.Мещерякова, А.А.Мещеряков)


### Алгоритм диагностики трофобластической болезни и выбора тактики лечения



\* - определение ХГ 1 раз в месяц – 6 месяцев, 1 раз в 2 месяца – 6 месяцев; 1 раз в 4 месяца – 2-й год, 1 раз в год – 2 года;

\*\* - контрацепция в течение 1 года после окончания химиотерапии, для больных с отдаленными метастазами (кроме метастазов в легких) – 2 года.

### Алгоритм лечения больных злокачественными трофобластическими опухолями



Примечания:

- 3 цикла профилактики проводятся тем же режимом химиотерапии, на котором достигнута ремиссия;
- плато или рост ХГ - плато или снижение уровня ХГ менее 10%, зафиксированное при 3 последовательных исследованиях в течение 10-14 дней или увеличение уровня ХГ на 20% и более во время или по окончании химиотерапии (до 6 месяцев), зафиксированное при 3 последовательных исследованиях в течение 10-14 дней
- наблюдение - определение ХГ 1 раз в месяц – 6 месяцев, 1 раз в 2 месяца – 6 месяцев; 1 раз в 4 месяца – 2-й год, 1 раз в год – 2 года

**План первичного обследования больных, мониторинга  
в процессе лечения и в период ремиссии (Мещерякова Л.А., Мещеряков А.А.)**

Методы исследования/ период	До начала лечения	До нормализации показателей (период эффективного лечения)	При нормальном уровне ХГ (ремиссия)	Плато или рост ХГ
Менограмма	+	+	+	+
Гинекологический осмотр	+	по показаниям	по показаниям	+
Исследование уровня ХГ крови	+	еженедельно до нормализации уровня, далее – 1 раз в 2 недели	1 раз в 2 нед. – первые 3 мес., затем – ежемесячно до 6 мес., 1 раз в 2 мес. – до 1 года*	последовательно 3 исследования в течение 10 дней
УЗИ органов малого таза	+	по окончании химиотерапии **	до нормализации УЗ – картины 1 раз в 2 месяца, затем – по показаниям	+
Рентгенологическое исследование легких	+	по окончании химиотерапии у больных с метастазами в легких***	1 раз в год	+
РКТ головного мозга	при III и IV стадиях болезни	по показаниям	–	у больных с III-IV стадиями болезни
УЗИ печени, почек, селезенки, забрюшинных л/у	у больных с метастазами в легких	по показаниям	по показаниям	+
РКТ легких	высокий уровень ХГ без визуализируемой опухоли	-	-	у больных с метастазами в легких
МРТ головного мозга	при выявлении метастазов в мозге	в момент нормализации маркера и после окончания профилактической химиотерапии	каждые 6 месяцев в течение 2 лет	у больных с церебральными метастазами

\* – у больных с IV стадией болезни – контроль ХГ 1 раз в 2 – 3 месяца – до 2 лет;

\*\* – острые боли в животе, кровотечение во время химиотерапии;

\*\*\* – у больных с метастазами в легкие 5см и более, с массивными метастазами, расположенными субплеврально, – 1 раз в месяц.